

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТРАУМЕЛЬ С TRAUMEEL® S

Торговое название препарата: Траумель С

Лекарственная форма: раствор для инъекций

Состав:

1 ампула 2,2 мл (= 2,2 г) содержит:

активные вещества:

Тысячелистник обыкновенный	D3	2.20 мг
Ромашка аптечная	D3	2.20 мг
Окопник лекарственный	D6	2.20 мг
Аконит клобучковый	D2	1.32 мг
Белладонна	D2	2.20 мг
Маргаритка многолетняя	D2	1.10 мг
Календула	D2	2.20 мг
Эхинацея	D2	0.55 мг
Эхинацея пурпурная	D2	0.55 мг
Зверобой продырявленный	D2	0.66 мг
Серная печень	D6	2.20 мг
Ртуть растворимая по Ганеману	D6	1.10 мг
Гамamelis виргинский	D1	0.22 мг
Арника горная	D2	2.20 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций

Описание: Траумель С – это прозрачный бесцветный раствор в стеклянных ампулах.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лекарственные препараты для лечения воспалительных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Код АТХ: VO3AX

Фармакологические свойства

Не применимо.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Гомеопатический лекарственный препарат, используемый для лечения растяжения, перенапряжения связок и сухожилий, переломов и трещин костей, разрыва мягких тканей, послеоперационных и посттравматических отеков мягких тканей, воспаления различных органов и тканей, в том числе, опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит, артроз).

Способ применения и дозы

Стандартная доза:

Взрослые и дети (с 12 лет): по 1 ампуле от 1 до 3 раз в неделю.

Дозирование при острых формах заболевания и в начале лечения:

Взрослые и дети (с 12 лет): по 1 ампуле ежедневно, затем продолжить по стандартной схеме.

Детская стандартная доза:

6-11 лет: $\frac{2}{3}$ ампулы от 1 до 3 раз в неделю.

2-5 лет: $\frac{1}{2}$ ампулы от 1 до 3 раз в неделю.

Дозирование при острых формах заболевания и в начале лечения:


6-11 лет: $\frac{2}{3}$ ампулы ежедневно, затем продолжить по стандартной схеме.

2-5 лет: $\frac{1}{2}$ ампулы ежедневно, затем продолжить по стандартной схеме.

Способ применения

Инъекции Траумель С вводятся п\к, в\к, в\м, в\с или в\в.

Инструкция по открытию стеклянных ампул:



Будьте осторожны. Строго следуйте инструкции. Нет необходимости резать стеклянную ампулу. Держите ампулу под углом, колпачком вверх, чтобы жидкость стекла вниз ампулы. Надавлив на цветную точку, отломите головку ампулы. Любые остатки содержимого ампулы должны быть утилизированы.

Побочные действия

Как и все лекарственные средства, препарат может вызвать побочные действия, в редких случаях.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Аллергические реакции (кожная сыпь, покраснение/отек в месте инъекции, анафилактический шок) встречаются очень редко (частота 1:10000 случаев).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам препарата, включая растения из семейства ромашковых (сложноцветных), такие как арника горная, календула лекарственная, аптечная ромашка, эхинацея, тысячелистник обыкновенный, маргаритка многолетняя или к другим вспомогательным компонентам препарата.

Лекарственные взаимодействия

Не выявлены, и не следует ожидать, в связи с гомеопатическим разведением.

Предупредите врача о других лекарственных препаратах, которые вы принимаете, когда либо принимали, или планируете принимать.

Особые указания

Отсутствуют.

Беременность, лактация и репродуктивный период

Клинические исследования на беременных и кормящих грудью женщинах не проводились. Компоненты препарата не оказывают негативного влияния на течение беременности и лактацию, в связи с гомеопатическим разведением.

Если вы беременны, кормите грудью или планируете беременность, проконсультируйтесь со специалистом до использования лекарственного препарата.

Влияние на способность управлять автомобилем и сферы требующие концентрации внимания

Не влияет.

Передозировка

Не зафиксировано ни одного случая передозировки и не следует ожидать, в связи с гомеопатическим разведением.

Форма выпуска

Стеклянные ампулы гидrolитического типа I, с принципом вскрытия в месте насечки.

Упаковка: по 5 или 100 ампул.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C.

Хранить в темном и недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden,

Germany

Tel : +49 72 21 / 501-00

Fax : +49 72 21 / 501-210

E-Mail : info@heel.com

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО "Business Excellence Consulting"

Ул. Ойбека, 24, г. Ташкент, 100015, Узбекистан

Тел.: (998 71) 281 46 35