



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТРАУМЕЛЬ С TRAUMEEL® S

Торговое название препарата: Траумель С

Лекарственная форма: таблетки

Состав:

1 таблетка (301,5 мг) содержит:

активные вещества:

Тысячелистник обыкновенный	D3	15,0	мг
Аконит клобучковый	D3	30,0	мг
Белладонна	D4	75,0	мг
Серная печень	D8	30,0	мг
Ромашка аптечная	D3	24,0	мг
Ртуть растворимая по Ганеману	D8	30,0	мг
Окопник лекарственный	D8	24,0	мг
Маргаритка многолетняя	D2	6,0	мг
Календула	D2	15,0	мг
Эхинацея	D2	6,0	мг
Эхинацея пурпурная	D2	6,0	мг
Гамamelis виргинский	D2	15,0	мг
Зверобой продырявленный	D2	3,0	мг
Арника горная	D2	15,0	мг

Вспомогательные вещества: моногидрат лактозы, стеарат магния.

Описание: Траумель С – таблетки от белого до желтовато-белого цвета, круглой и плоскоцилиндрической формы с фаской. Иногда с оранжевыми вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа: прочие лекарственные препараты для лечения воспалительных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Код АТХ: VO3AX

Фармакологические свойства

Не применимо.

Фармакокинетика

Не применимо.

Показания к применению

Гомеопатический лекарственный препарат, используемый для лечения растяжения, перенапряжения связок и сухожилий, переломов и трещин костей, разрыва мягких тканей, послеоперационных и посттравматических отеков мягких тканей, воспаления различных органов и тканей, в том числе, опорно-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит, артроз).

Способ применения и дозы

Стандартная доза:

Взрослые и дети (с 12 лет): по 1 таблетке 3 раза в день

Дозирование при острых формах заболевания и в начале лечения:

Взрослые и дети (с 12 лет): по 1 таблетке каждые 30 - 60 мин., до 12 таблеток в день, затем продолжить по стандартной схеме.

Детская стандартная доза:

6-11 лет: по 1 таблетке 2 раза в день.

2-5 лет: по 1 таблетке 1-2 раза в день.

До 2 лет: по 1 таблетке 1 раз в день.

Дозирование при острых формах заболевания и в начале лечения:

6-11 лет: по 1 таблетке каждые 1 - 2 ч., до 8 таблеток в день, затем продолжить по стандартной схеме.

2-5 лет: по 1 таблетке каждые 1 - 2 ч., до 6 таблеток в день, затем продолжить по стандартной схеме.

До 2 лет: по 1 таблетке каждые 1 - 2 ч., до 4 таблеток в день, затем продолжить по стандартной схеме.

Способ применения

Предпочтительно рассосать таблетку во рту и проглотить. Для детей можно растолочь таблетку и растворить в небольшом количестве воды. Не принимать во время еды.

Побочные действия

Как и все лекарственные средства, препарат может вызвать побочные действия, в редких случаях.

В отдельных случаях сообщалось о транзиторных кожных реакциях.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к активным компонентам препарата, включая растения из семейства ромашковых (сложноцветных), такие как арника горная, календула лекарственная, аптечная ромашка, эхинацея, тысячелистник обыкновенный, маргаритка многолетняя или к другим вспомогательным компонентам препарата.

Лекарственные взаимодействия

Не выявлены, и не следует ожидать, в связи с гомеопатическим разведением.

Предупредите врача о других лекарственных препаратах, которые вы принимаете, когда либо принимали, или планируете принимать.

Особые указания

Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости глюкозы, дефицитом лактазы или при глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует принимать этот лекарственный препарат.

Беременность, лактация и репродуктивный период

Клинические исследования на беременных и кормящих грудью женщинах не проводились. Компоненты препарата не оказывают негативного влияния на течение беременности и лактацию, в связи с гомеопатическим разведением.

Если вы беременны, кормите грудью или планируете беременность, проконсультируйтесь со специалистом до использования лекарственного препарата.

Влияние на способность управлять автомобилем и сферы требующие концентрации внимания

Не влияет.

Передозировка

Не зафиксировано ни одного случая передозировки и не следует ожидать, в связи с гомеопатическим разведением.

Форма выпуска

Полипропиленовый белый контейнер для таблеток с полипропиленовой белой крышкой.
Размер упаковки: 50 таблеток.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 30°C.
Хранить в темном и недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет
Срок годности после вскрытия: 12 месяцев

Условия отпуска из аптек

Отпускается без рецепта.

Производитель**ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ**

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden,
Germany
Tel : +49 72 21 / 501-00
Fax : +49 72 21 / 501-210
E-Mail : info@heel.com

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО "Business Excellence Consulting"
Ул. Ойбека, 24, г. Ташкент, 100015, Узбекистан
Тел.: (998 71) 281 46 35